

«Психология зависимого поведения»

Вопросы и ответы из теста по [Психологии зависимого поведения](#) с сайта [oltest.ru](#).

Общее количество вопросов: 71

Тест по предмету «Психология зависимого поведения».

Список тем:

- [Профилактика зависимого поведения подростков](#)

Профилактика зависимого поведения подростков

1. I группа профилактического учета включает все следующие категории подростков, кроме:

- **больных алкоголизмом**

2. Абсолютным признаком сформировавшегося влечения к наркотику у подростков является:

- **одиночное употребление наркотика**

3. Алкоголизм у родителей повышает вероятность развития его у детей в сравнении с частотой в популяции:

- **в 4 раза**

4. Алкогольная деградация включает в себя все перечисленное, за исключением:

- **расстройства мышления в виде разорванности**

5. Больным наркоманией в преморбиде присущи все перечисленные особенности, кроме:

- **паранойальности**

6. В настоящее время для наркоманий характерны все перечисленные тенденции, исключая:

- **преимущественное употребление средств растительного происхождения**

7. В основе синдрома психической зависимости от наркотика лежит нарушение обмена норадреналина, приводящее:

- **к падению общего тонуса**
- **к психическому дискомфорту**
- **к снижению работоспособности**
- **к эмоциональному дискомфорту**

8. В структуре формирующегося алкогольного абстинентного синдрома преобладает группа расстройств:

- **вегетативно-астенических**

9. Внешний вид больных эфедроновой наркоманией характеризуется всем перечисленным, кроме:

- **значительного повышения веса тела**

10. Все перечисленные преморбидные личностные черты препятствуют развитию алкогольной болезни, кроме:

- **инфантилизма**

11. Вторичная профилактика наркологических заболеваний — это:

- **система мер, направленных на раннюю диагностику болезней, выявление групп риска, применение лечебных и корригирующих мероприятий**



12. Высокий темп прогрессивности алкоголизма определяется всем перечисленным, кроме:

- **нарушения жирового обмена**

13. Галлюциногены применяются:

- **нерегулярно**

14. Для дифференциации профилактической работы выделяется группа «риска», которую составляют все следующие контингенты, исключая:

- **подростков и взрослых, больных алкоголизмом**

15. Для истинных запоев характерно все перечисленное, кроме:

- **появления на этапе II стадии болезни**

16. Для псевдозапоев характерно все перечисленное, кроме:

- **отчетливого изменения психического и физического состояния за несколько дней до псевдозапоя**

17. Единственным условием членства общества анонимных алкоголиков является:

- **желание бросить пить**

18. Если 100 лет назад соотношение между мужчинами и женщинами, злоупотребляющими алкоголем, составляло 10:1, то в настоящее время этот разрыв в среднем составляет:

- **5:1**

19. Изначальная толерантность к алкоголю обусловлена одним из перечисленных факторов:

- **активностью фермента алкогольдегидрогеназы**

20. К внешним характерным признакам алкогольного синдрома плода относятся все перечисленные, кроме:

- **заячьей губы**

21. К классу веществ, способных вызывать зависимость, относят все перечисленные, кроме:

- **нейролептических средств**

22. Клиника острой интоксикации галлюциногенами (психотомиметиками) выражается:

- **возникновением ощущения невероятно яркой окраски окружающих предметов, усиления громкости звуков**
- **пассивным созерцанием или активными оборонительными действиями**
- **появлением зрительных и слуховых иллюзий, галлюцинаций**
- **разнообразными эмоциональными нарушениями — эйфорией, тревогой, страхом**

23. Клиника острой интоксикации кокаином характеризуется всем перечисленным, кроме:

- **чувства голода**

24. Клиника острой интоксикации опиумом характеризуется последовательно сменяющимися друг друга расстройствами, исключая:

- **психомоторное возбуждение**

25. Клиника острой интоксикации эфедронами выражается всеми перечисленными признаками, исключая:

- **конфликтность, агрессивность**

26. Клинические проявления своеобразных эфедроновых циклов характеризуются всем перечисленным, кроме:

- **снижения активности**



27. Компulsive влечение к наркотику характеризуется всеми перечисленными признаками, кроме:

- **несобранности, рассеянности больного**

28. Мотивами потребления наркотиков чаще всего являются:

- **желание испытать новые ощущения**
- **желание отвлечься от будничных трудностей**
- **необходимость признания «своим» в микрогруппе**
- **удовлетворение любопытства**

29. Наиболее достоверными вегетативными признаками острой опийной интоксикации являются все перечисленные, кроме:

- **сохранения кашлевого рефлекса**

30. Наиболее опасным для нормального развития плода является употребление алкоголя женщинами в период беременности:

- **7-8 недель**

31. Не имеющее аналогов при других формах зависимости явление — взаимозаменяемость опиатов, эфедрона и транквилизаторов — наблюдается:

- **при эфедроновой наркомании**

32. Несмотря на полиморфизм личностных особенностей, больных наркоманией объединяют сходные особенности все перечисленных сфер, кроме:

- **соматической**

33. О низком качестве профилактической работы говорит:

- **значительный процент больных со II стадией заболевания с впервые установленным диагнозом**

34. Об острой интоксикации гашишем свидетельствуют все перечисленные расстройства, исключая:

- **ощущение угасания звуков**

35. Общими чертами актуализации compulsive влечения к наркотику для всех форм наркоманической зависимости являются все перечисленные, исключая:

- **появление головной боли**

36. Определение понятия «полинаркомания» включает:

- **одновременное или попеременное употребление двух и более наркотических средств**

37. Особенности клиники алкоголизма у женщин являются все перечисленные, кроме:

- **замедленного темпа формирования**

38. Отечественные исследователи при классификации алкоголизма используют преимущественно критерии:

- **клинико-динамические**

39. Первичная профилактика наркологических заболеваний — это:

- **система мер воздействия на причину, условия развития болезней или на повышение устойчивости организма человека к неблагоприятным факторам**

40. Перечисленные данные анамнеза характерны для второй стадии алкоголизма, кроме:

- **снижения толерантности**

41. Под группой «относительного риска» в оперативной практике работы ОВД по борьбе с наркоманиями и токсикоманиями понимают всех следующих лиц, кроме:

- **лиц, экспериментирующих на себе или других действие наркотических или одурманивающих средств без осознания последствий наркотизации**



42. Преморбид больных наркоманией характеризуется всем перечисленным, кроме:

- **сформированности индивидуальных интересов**

43. При острой интоксикации смерть наступает при концентрации алкоголя в крови

- **500-600 мг%**

44. При сформировавшемся психическом влечении в отсутствии наркотика обязательны:

- **психический дискомфорт**

45. Признаками пристрастия к алкоголю и формирующейся зависимости являются:

- **«опережение» с тостом**
- **желание «добавить» после приема какой-то дозы алкоголя**
- **оживление, повышение активности, предвидение события, традиционно предполагающего употребление алкоголя**

46. Применение методики стрессопсихотерапии больных алкоголизмом в амбулаторных условиях (по А.Р. Довженко) показано всем перечисленным, кроме больных:

- **проходящих принудительное противоалкогольное лечение**

47. Применением метода рациональной психотерапии у больных алкоголизмом можно:

- **аутоидентифицировать первичное патологическое влечение к алкоголю**
- **выработать навыки поведения, препятствующие срыву ремиссии**
- **провести ценностную переориентировку**
- **уменьшить проявление алкогольной анозогнозии**

48. Работа кабинета анонимного лечения осуществляется таким образом, что:

- **заводится медицинская амбулаторная карта без указания фамилии и адреса обратившегося**

49. Решение о назначении принудительного лечения принимается:

- **судом**

50. С учетом детско-юношеской психологии для успешной санитарно-просветительной работы рекомендуется формировать следующие возрастные группы, кроме:

- **10-15 лет**

51. Симптом нарастающей толерантности характеризуется всем перечисленным, исключая:

- **проявление в III стадии алкоголизма**

52. Синдром измененной реактивности включает все перечисленное, кроме:

- **появления абстинентного синдрома**

53. Синдром психической зависимости от наркотика включает все перечисленное, исключая:

- **абстинентное нарушение**

54. Синдром психической зависимости при алкоголизме отражает стремление больного изменить в своем состоянии все перечисленное, кроме:

- **устранить плохое физическое состояние от предыдущего алкогольного эксцесса**

55. Синдром сопутствующих последствий у подростков-наркоманов проявляется:

- **задержкой психического развития**
- **интеллектуальным снижением**
- **поражением «ростовых точек» (эндокринной и психической систем)**
- **психопатоподобными изменениями личности**

56. Синдром физической зависимости от наркотика включает все перечисленное, кроме:

- **способности достижения психического комфорта в интоксикации**



57. Синдром физической зависимости при алкоголизме отражает стремление больного изменить в своем состоянии все перечисленное, за исключением:

- **желания расслабиться, уйти от невзгод**

58. Ситуационно-психологический тренинг больных алкоголизмом включает в себя:

- **групповую дискуссию**
- **обучение саморегуляции**
- **разыгрывание ролевых ситуаций**

59. Создание оптимальных взаимоотношений в системе «врач — больной — семья» позволяет:

- **осуществлять проведение реабилитационных программ**
- **проводить семейную психотерапию**
- **прогнозировать стабильную терапевтическую ремиссию**

60. Социальный аспект проблемы распространения алкоголизма и наркоманий в мире в настоящее время определяется:

- **нравственной деформацией, интеллектуальной отсталостью, низкой культурой части населения**
- **появившимся большим числом жителей трущоб («скидрои»)**
- **растущим организованным бизнесом, осуществляемым национальными и международными синдикатами, производителями, продающими и сбывающими алкоголь, наркотики и наркотические лекарственные средства**

61. Способствуют повышению «риска» возможного развития наркомании и токсикомании:

- **импульсивность, стремление к удовольствиям, к поиску новых, в том числе необычных ощущений**
- **низкая устойчивость к психическим «перегрузкам», стрессам**
- **самоуверенность, повышенная самооценка, эгоцентризм, игнорирование общепринятых норм**
- **тревожность, неуверенность в себе, пониженная самооценка, внушаемость, конформизм**

62. Среди женщин, больных алкоголизмом, преобладают лица, занятые:

- **в торговле, сфере услуг**

63. Среди социальных факторов, имеющих отношение к развитию алкоголизма, выделяют:

- **алкогольную политику государства**
- **обычаи ближайшего окружения**
- **социальное положение индивидуума и его экономическую обеспеченность**
- **этническую и религиозную принадлежность индивидуума**

64. Существенное значение в возникновении наркологических заболеваний имеют:

- **нездоровые отношения в семье**
- **плохо организованный досуг, быт**
- **традиции данного региона, группы людей**

65. Третичная профилактика наркологических заболеваний — это:

- **система мер, направленных на выявление и лечение больных, сдерживание темпа прогрессивности, предупреждение рецидивов**

66. Уголовная ответственность с последующим лишением свободы на срок от 1 года до 10 лет предусматривается за все перечисленное, исключая:

- **потребление или приобретение токсикоманических средств без врачебного предписания**

67. Форма воспитания по типу гипопротекции включает все перечисленное, кроме:

- **строгого наказания, мелочной опеки**



68. Характеристика термина «наркотическое средство» включает следующие критерии:

- **медицинский**
- **социальный**
- **юридический**

69. Целостная система организации наркологической помощи в России включает в себя:

- **общественные организации**
- **соответствующие структуры МВД**
- **учреждения здравоохранения**

70. Эпидемиологические исследования проблемы наркоманий свидетельствуют о том, что в настоящее время в Западной Европе и США особенно заметно растет число лиц, злоупотребляющих:

- **героином**

71. Эффективность лечения алкоголизма методом имплантации препарата эспераль обуславливается всеми факторами, кроме:

- **химико-биологической активности**

Файл скачан с сайта oltest.ru

