

«Лечебное дело»

Вопросы и ответы из теста по [Лечебному делу](#) с сайта [oltest.ru](#).

Общее количество вопросов: 299

Квалификационные тесты для сертификации по лечебному делу для фельдшеров скорой медицинской помощи.

1. «Доскообразный» живот наблюдается при:
 - **перфоративной язве желудка**
2. Антидотом при отравлении опиоидами является:
 - **налоксон**
3. Антидотом при отравлении фосфорорганическими соединениями (ФОС) является:
 - **0,1% раствор атропина сульфат**
4. Аритмические обмороки бывают при:
 - **желудочковой пароксизмальной тахикардии**
5. Аускультативная картина альвеолярного отёка лёгких
 - **влажные хрипы в нижних отделах, а затем над всей поверхностью лёгких**
6. Аускультативные данные при приступе бронхиальной астмы
 - **сухие свистящие хрипы**
7. Боли при дыхании у больных с крупозной пневмонией обусловлены:
 - **поражением плевры**
8. Больной с тромбоэмболией легочной артерии транспортируется:
 - **в горизонтальном положении со слегка приподнятым изголовьем**
9. Ботулотоксин в организме человека поражает:
 - **клетки нервной системы**
10. Бронхиальное дыхание, крепитация, влажные и сухие хрипы выслушиваются при:
 - **долевой пневмонии**
11. В асфиктической стадии стеноза гортани появляются симптомы:
 - **острой дыхательной недостаточности**
12. В начале лекарственной терапии при отёке лёгких на фоне артериальной гипотензии необходимо ввести:
 - **допамин**
13. В первой стадии неполного стеноза гортани затруднение дыхания:
 - **при вдохе**
14. В период критического падения температуры при крупозной пневмонии у больного может развиваться:
 - **коллапс**
15. В свободное от вызовов время фельдшер:
 - **находится в помещении станции скорой помощи без права сна**



16. В случае внезапной смерти или подозрении на насильственную смерть, происшедшую на квартире до приезда бригады, фельдшер скорой помощи должен:

• **сообщить в полицию, информировать старшего врача, дожидаться представителей органов МВД, оставить труп под их ответственность**

17. В состав выездной фельдшерской бригады входят:

• **водитель**
• **санитар**
• **фельдшер**

18. В целях профилактики педикулеза в салонах машин рекомендуют использовать:

• **Педикулоциды в аэрозольной упаковке**

19. Важнейшим отличительным признаком астматического статуса от тяжелого приступа бронхиальной астмы является:

• **отсутствие дыхательных шумов при аускультации**

20. Важнейшим элементом приоритетного национального проекта «Здоровье» в сфере здравоохранения является:

• **повышение качества оказания скорой медицинской помощи**

21. Ваши действия, когда по пути на вызов Вас останавливают сотрудники полиции, требуя оказать медицинскую помощь пострадавшему на улице

• **остановитесь, выйдите из машины, удостоверившись в наличии больного (пострадавшего) и, согласовав свои действия со старшим врачом, начнете оказывать помощь больному**

22. Введение атропина на догоспитальном этапе показано при:

• **полной атриовентрикулярной блокаде**

23. Ведущий признак отека легких

• **чувство нехватки воздуха, выделение розовой пенистой мокроты**

24. Виды наказаний, установленные УК РФ за неоказание помощи больному

• **штраф, исправительные работы, арест, лишение свободы, лишение права заниматься определенной деятельностью**

25. Возможные осложнения при странгуляционной асфиксии

• **перелом хрящей гортани, позвоночника, разрыв трахеи**

26. Второй период родов начинается с момента

• **полного раскрытия шейки матки**

27. Выездная бригада скорой медицинской помощи является:

• **структурно-функциональной единицей станции, подстанции, отделения скорой медицинской помощи**

28. Выполнение коникотомии требуется при:

• **обтурации инородным телом верхних дыхательных путей**

29. Гарантированный объем оказания населению скорой медицинской помощи обеспечивается за счет

• **средств местных бюджетов**

30. Гиперосмолярная диабетическая кома обусловлена:

• **повышением осмотического давления**



31. Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца взрослому человеку должна быть:
- **4-5 см**
32. Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца новорожденному должна быть:
- **1-1,5 см**
33. Госпитализация больного в психиатрический стационар в недобровольном порядке может быть осуществлена:
- **если он представляет непосредственную опасность для себя или окружающих**
34. Данные о присвоении квалификационной категории работников из числа врачебного, фармацевтического и среднего медицинского персонала в трудовую книжку
- **вносят обязательно**
35. ДВС-синдром может быть следствием:
- **эклампсии**
36. Диагностические признаки, наиболее характерные для ишемического инсульта:
- **преобладание очаговых симптомов над общемозговыми, относительная устойчивость жизненно важных функций**
37. Диагностические признаки, характерные для геморрагического инсульта:
- **преобладание общемозговых симптомов над очаговыми, выраженные вегетативные нарушения, быстрое угнетение сознания**
38. Диагностическими критериями пневмоторакса являются:
- **тимпанический перкуторный звук, резкое ослабление дыхания**
39. Дифференциальный диагноз аппендицита у беременных проводится с:
- **угрозой прерывания беременности**
40. Дифференциальный диагноз между анурией и острой задержкой мочи на догоспитальном этапе может быть проведен с помощью
- **катетеризации мочевого пузыря**
41. Для III степени дегидротации характерна потеря жидкости в объеме
- **7-9% от массы тела**
42. Для алкогольного делирия (белой горячки) характерно развитие:
- **через 2-4 дня после последнего употребления алкоголя на фоне абстиненции**
43. Для алкогольного делирия (белой горячки) характерно:
- **наплыв ярких истинных галлюцинаций**
44. Для алкогольной комы характерны следующие признаки:
- **нарушение сознания, мидриаз, снижение температуры тела, снижение артериального давления, гиперсаливация**
45. Для барбитуратовой комы характерно:
- **сужение зрачков, потливость, бронхорея, гиперсаливация, гипотермия, гиповентиляция**
46. Для истерических судорог характерно:
- **нормальная реакция зрачков на свет**



47. Для кетоацидотической гипергликемической комы характерным симптомом является:
- **снижение тонуса мышц и глазных яблок**
48. Для кровопотери до 1 литра крови индекс Альговера составляет:
- **не более 1,2**
49. Для купирования острого лёгочного сердца применяют:
- **зуфиллин, дигоксин**
50. Для неосложнённого гипертонического криза характерны симптомы
- **головная боль, головокружение, тошнота**
51. Для острой массивной внутренней кровопотери характерно развитие
- **шока, коллапса, анемии, сдавления жизненно важных органов**
52. Для повреждения паренхиматозных органов брюшной полости с разрывом, является характерным развитие
- **внутреннего кровотечения**
53. Для пыльцевой бронхиальной астмы характерно:
- **обострение в весенне-летнее время года**
54. Для снижения абсорбции препарата из кишечника внутрь назначают:
- **активированный уголь**
55. Для транспортировки пациента с инфекционно – токсическим шоком необходимо
- **стабилизировать артериальное давление**
56. Достоверными признаками перитонита токсической стадии является:
- **вздутие живота и отсутствие перистальтических шумов**
57. Если в процессе работы возникает ситуация загрязнения салона или оборудования в нем выделениями или кровью пациента, то следует:
- **немедленно провести обеззараживание мест загрязнения**
58. Заболевание, при котором наиболее часто возникает нейротоксикоз
- **грипп**
59. Запах изо рта при кетоацидотической коме напоминает:
- **запах ацетона**
60. Изменения на ЭКГ в острейшем периоде Q — образующего инфаркта миокарда
- **резкий подъём сегмента ST, патологический зубец Q, ещё не сформировался**
61. Изменения на ЭКГ в остром периоде Q — образующего инфаркта миокарда
- **патологический зубец Q, подъём сегмента ST относительно изолинии**
62. Иммобилизация отломков при переломах нижней челюсти это:
- **наложение иммобилизирующей, пращевидной повязки на нижнюю челюсть**
63. Инсульт — это:
- **острое нарушение мозгового кровообращения**
64. Информация о состоянии здоровья пациента предоставляется:
- **непосредственно самому гражданину и только с его согласия другим лицам**



65. Искусственное прерывание беременности проводится при сроке беременности
- **до 12 недель**
66. Источником инфекции при менингите является:
- **больной человек и бактерионоситель**
67. Ишемический инсульт развивается в следствие:
- **спазма, тромбоза, тромбоэмболии внутримозгового сосуда**
68. Ишемия миокарда помимо болевого приступа может проявляться:
- **одышкой**
69. К веществам психотропного действия относятся:
- **барбитураты, нейролептики, антидепрессанты**
70. К гиповолемическому относится шок:
- **травматический**
71. К группе барбитуратов относится:
- **фенобарбитал**
72. К группе сердечных гликозидов относятся:
- **дигоксин**
73. К лекарственным препаратам, которые наиболее часто вызывают анафилактический шок, относятся:
- **антибиотики**
74. К общемозговой симптоматике при поражении ЦНС относится:
- **головная боль, тошнота, рвота**
75. К острым осложнениям при отравлениях едкими веществами относятся:
- **перфорация пищевода или желудка**
76. К третьему этапу послеродовых гнойно-септических заболеваний относится:
- **акушерский перитонит**
77. К триаде симптомов, характерных для острого стеноза гортани, относятся:
- **изменение голоса, грубый «лающий» кашель и стенотическое дыхание**
78. Как будете общаться с больным, если у него моторная афазия:
- **будете задавать вопросы т.к. больной Вас понимает и может дать ответ мимикой, жестом**
79. Кардиогенный шок (истинный) — это:
- **внезапное уменьшение сердечного выброса, сопровождающееся продолжительным снижением систолического АД менее 90 мм рт. ст. и признаками нарушения перфузии органов и тканей**
80. Кетоацидотическая диабетическая кома обусловлена:
- **накоплением кетоновых тел и связанным с этим ацидозом**
81. Классическая клиническая картина отравления опиоидами проявляется:
- **угнетение ЦНС и дыхания, миоз**
82. Клинические признаки опиатной комы:
- **бледность, цианоз, точечные зрачки, гипотермия, брадикардия, артериальная гипотензия, угнетение дыхания**



83. Клинические признаки цереброваскулярной комы:

- **быстрое угнетение сознания, неврологическая симптоматика на фоне острых гемодинамических нарушений**

84. Клиническим проявлением внезапно развившейся полной атриовентрикулярной блокады является:

- **приступ Морганьи-Адамс-Стокса**

85. Количество воды, необходимое для промывания желудка при пероральном отравлении:

- **8-12 литров воды комнатной температуры**

86. Кровотечение из матки во второй половине беременности чаще обусловлено:

- **предлежанием плаценты**

87. Лекарственный препарат для купирования аритмического шока, развившегося вследствие пароксизмальной желудочковой тахикардии

- **Лидокаин**

88. Лекарственный препарат для купирования инфекционно-токсического шока

- **Преднизолон**

89. Лекарственный препарат для купирования рефлекторного шока, осложняющего течение инфаркта миокарда

- **Морфин**

90. Локализация крови при гемоперитонеуме

- **в брюшной полости**

91. Максимальным сопротивлением электропроводности обладают:

- **сухая кожа**

92. Массаж каротидного синуса может купировать пароксизм

- **наджелудочковой тахикардии**

93. Медицинский персонал, бывший в контакте с больными особо опасными инфекциями, подлежит:

- **изоляции на срок инкубации с проведением превентивного лечения**

94. Медицинский работник может не надевать перчатки

- **при измерении АД**

95. Менингеальный симптом — это:

- **Симптом Брудзинского**

96. Местом приложения усилий при непрямом массаже сердца взрослому человеку является:

- **граница между средней и нижней третью грудины**

97. На догоспитальном этапе пациенту с открытым пневмотораксом необходимо

- **вести гемостатический препарат, наложить окклюзионную повязку**

98. На догоспитальном этапе при остром желудочно-кишечном кровотечении проводится:

- **внутривенное введение кровезаменителей гемодинамического действия, наложение холода на эпигастральную область, транспортировка на носилках, госпитализация**

99. На догоспитальном этапе при открытом переломе костей носа необходимо провести

- **туалет раны, наложение асептической повязки, переднюю тампонаду носовых ходов, наложение працевидной повязки, холод, транспортировку в ЛОР-отделение**



100. На догоспитальном этапе при ущемленной грыже необходимо
- **не проводить медикаментозного лечения, вправление грыжевого мешка не допускается, осуществить госпитализацию пациента**
101. На исход странгуляционной асфиксии влияют:
- **положение пострадавшего в петле, расположение странгуляционной борозды, материал петли, степень повреждения органов шеи**
102. На коже больных менингитом
- **геморрагическая сыпь в виде звездочек**
103. На первом этапе купирования эпилептического статуса применяется:
- **внутривенное введение 0,5% раствора седуксена (реланиума)**
104. Назовите признак, характерный только для перелома:
- **крепитация костных отломков**
105. Наиболее вероятной причиной острой задержки мочи является:
- **механическое препятствие по ходу мочевыводящих путей**
106. Наиболее тяжелое осложнение в родах при тазовом предлежании
- **травматическое повреждение матери и плода**
107. Наиболее характерным внешним признаком внутреннего кровотечения является:
- **выраженная бледность кожных покровов**
108. Наиболее характерным симптомом для гемартроза является:
- **симптом «баллотирования» надколенника**
109. Нарушение правил хранения, учета, использования наркотических средств лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил, влечет за собой ответственность
- **административную**
110. Не относится к компетенции военно-врачебных комиссий
- **установление военнослужащим инвалидности**
111. Нейротоксикоз в первой фазе проявляется:
- **симптомами возбуждения центральной нервной системы**
112. Неотложная помощь при гипергликемической коме на догоспитальном этапе
- **введение физиологического раствора**
113. Неотложная помощь при гипогликемической коме
- **глюкоза внутривенно**
114. Неотложная помощь при нейротоксикозе проводится введением группы препаратов
- **гипотензивных**
115. Неотложная помощь при острой задержке мочи вследствие аденомы предстательной железы
- **катетеризация мочевого пузыря**
116. Неотложная помощь при почечной колике
- **Но-шпа**
117. Неотложная помощь ребёнку с эксикозом второй степени включает проведение
- **оральной и парентеральной регидратации**



118. Низкое давление при шоке приводит к снижению перфузии почек, проявляющемуся

- **олигурией**

119. Обморок — это:

- **внезапная кратковременная потеря сознания**

120. Общественной организацией в области организации, диагностики и лечения неотложных состояний в России на догоспитальном этапе является:

- **Российское общество скорой медицинской помощи (РОСМП)**

121. Объектами машины скорой помощи, подвергающимися дезинфекции являются:

- **все поверхности в салоне**

122. Объективное обследование пациента с острым отравлением обязательно включает:

- **измерение артериального давления**

123. Объем первичной медико-санитарной помощи устанавливается:

- **местной администрацией в соответствии с территориальными программами ОМС**

124. Один из признаков анафилактического шока:

- **снижение артериального давления на 30-50 мм рт.ст. от исходного уровня**

125. Одним из основных принципов работы (под-)станции скорой помощи является:

- **своевременность оказания медицинской помощи**

126. Олигурия развивается при:

- **шоке**

127. Опоясывающая боль наблюдается при:

- **остром панкреатите**

128. Оральную регидратацию при эксикозе начинают с введения

- **раствора регидрона**

129. Основное осложнение, возникающее при проведении непрямого массажа сердца

- **перелом ребер**

130. Основной задачей подстанции скорой медицинской помощи является:

- **оказание круглосуточной медицинской помощи взрослому и детскому населению, как на месте происшествия, так и по пути следования**

131. Основной задачей службы скорой медицинской помощи является:

- **оказание экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе больным и пострадавшим**

132. Основной закон РФ, устанавливающий правовые, организационные и экономические принципы в области охраны здоровья граждан

- **основы законодательства РФ об охране здоровья граждан**

133. Основной путь передачи менингококковой инфекции

- **воздушно-капельный**

134. Основной функциональной единицей (под-)станции скорой медицинской помощи является:

- **выездная бригада (врачебная, фельдшерская)**



135. Основной функциональной обязанностью оперативного отдела станции скорой медицинской помощи является:

- **круглосуточный, централизованный прием вызовов, обращений населения**

136. Основным клиническим симптомом бронхиальной астмы является:

- **приступ удушья**

137. Основным критерием оценки качества скорой медицинской помощи является:

- **доступность**

138. Основным признаком остановки сердца является:

- **отсутствие пульса на сонной артерии**

139. Основопологающим документом для работы станций и отделений скорой медицинской помощи является:

- **приказ МЗ РФ №100 от 26.03.1999 года «О совершенствовании организации скорой медицинской помощи населению РФ»**

140. Особо опасные инфекции — это:

- **чума**

141. Острая боль в груди с развитием шока, выраженная одышка, наличие в анамнезе операции, позволяют предположить:

- **тромбоэмболию легочной артерии**

142. Острая левожелудочковая сердечная недостаточность проявляется:

- **Кардиогенным отёком лёгких**

143. Ответственным за оказание медицинской помощи при массовых происшествиях является:

- **фельдшер, первым прибывший к месту происшествия бригады (при отсутствии врача)**

144. Отек Квинке прежде всего появляется:

- **в области губ, щек, век, лба, волосистой части головы**

145. Отличительным признаком судорожного синдрома при столбняке является:

- **сохранение мышечной ригидности между приступами судорог**

146. Отравление считается суицидальным, если пациент:

- **умышленно выпил яд с целью самоубийства**

147. Очередность действий ответственного за оказание медицинской помощи на месте массового происшествия

- **сообщить о случившемся диспетчеру, определить место сбора пострадавших, провести сортировку пострадавших, сообщить диспетчеру о количестве и тяжести состояния пострадавших, приступить к оказанию медицинской помощи**

148. Пациенту с желудочным кровотечением необходимо обязательно осуществить:

- **эзофагогастродуоденоскопию**

149. Первая помощь при попадании крови пациента на кожу рук медицинского работника

- **обработать кожу рук 70% этиловым спиртом, вымыть руки под проточной водой**

150. Первыми специализированными бригадами на станциях скорой помощи явились:

- **психиатрические**

151. Перед началом сердечно-легочной реанимации больному следует придать положение

- **горизонтальное лежа на спине на твердой и ровной основе**



152. Передозировка сердечных гликозидов вызывает:

- **брадикардию**

153. Перечень социально значимых заболеваний определяется:

- **Правительством РФ**

154. Перитонит развивается при повреждении

- **кишечника**

155. Повышенное нормальное АД (в мм рт. ст.)

- **130-139 / 85-89**

156. Показанием для госпитализации в психиатрическую больницу является:

- **антиобщественное поведение психически больного**

157. Показанием для недобровольной госпитализации в психиатрический стационар является:

- **антиобщественное поведение больного**

158. Показанием для проведения временной электрокардиостимуляции на догоспитальном этапе является:

- **полная атриовентрикулярная блокада**

159. Помощь при начальном периоде истинного утопления включает:

- **ингаляцию кислорода, согревание, госпитализацию**

160. Помощь при переломе шейки бедра включает:

- **обезболивание, транспортную иммобилизацию - вакуумной шиной или вакуумным матрасом, госпитализацию**

161. Помощь при синкопальном утоплении включает:

- **санацию верхних дыхательных путей, искусственную вентиляцию легких, закрытый массаж сердца, ингаляцию кислорода, внутривенное введение глюкокортикостероидных и мочегонных средств**

162. Пострадавшие или больные, доставленные выездными бригадами скорой медицинской помощи должны быть переданы

- **дежурному персоналу приемного отделения лечебно профилактического учреждения с отметкой в карте вызова времени их поступления**

163. Пострадавших с ушибом головного мозга транспортируют:

- **на носилках с поднятым на 30° головным концом**

164. Права пациента определены в:

- **основах законодательства РФ об охране здоровья граждан**

165. Право на занятие частной медицинской практикой имеют лица получившие

- **диплом, сертификат и лицензию**

166. Предварительным условием медицинского вмешательства является:

- **информированное добровольное согласие гражданина**

167. Препарат, применяемый при остановке сердца

- **Адреналин**

168. Препаратом выбора для купирования пароксизмальной желудочковой тахикардии является:

- **Лидокаин**



169. Препаратом выбора для купирования приступа бронхиальной астмы является:

- **Эуфиллин**

170. Препаратом неотложной помощи при судорогах является:

- **Реланиум**

171. Препаратом первой очереди выбора для купирования тонико-клонических судорог является:

- **0,5% раствор седуксена (диазепама, реланиума)**

172. Препаратом первой очереди выбора для купирования фебрильных судорог является:

- **0,5% раствор седуксена (диазепама, реланиума)**

173. При анафилактическом шоке больного необходимо уложить:

- **с приподнятым ножным концом**

174. При артериальном кровотечении наблюдается истечение

- **алой крови пульсирующей струёй**

175. При брадикардии, вызванной передозировкой сердечными гликозидами, применяют:

- **атропин**

176. При введении диазепама в большой дозе возможны:

- **дыхательная аритмия, брадикардия, падение АД**

177. При вызовах по поводу криминальных случаев

- **осуществляется взаимодействие с сотрудниками полиции или прокуратуры**

178. При гипергликемической коме

- **наблюдается постепенное нарушение сознания до полной потери**

179. При гипотоническом кровотечении кровь из матки вытекает:

- **струёй и волнообразно**

180. При истинном кардиогенном шоке показано введение

- **допамина**

181. При кардиогенном отёке лёгких и нормальных показателях артериального давления пациенту следует придать положение

- **сидячее**

182. При коллапсе наблюдается:

- **снижение АД**

183. При кровоизлиянии в правое полушарие возможны:

- **левосторонняя гемиплегия**

184. При кровотечении из артерии конечности накладывается:

- **кровоостанавливающий жгут выше места повреждения**

185. При купировании истерических судорог необходимо в первую очередь:

- **удалить посторонних, не создавать суеты**

186. При легких острых аллергических заболеваниях применяют:

- **кларитин**

187. При механической кишечной непроходимости живот

- **асимметричен, вздут**



188. При наружном венозном кровотечении наблюдаются:

- **тёмно-вишнёвого цвета кровь, равномерно истекающая струя**

189. При невозможности катетеризировать мочевой пузырь больного транспортируют для госпитализации в урологическое отделение:

- **на носилках в положении лежа**

190. При обнаружении трупа умершего (погибшего) выездная бригада обязана:

- **привлечь сотрудников управления внутренних дел данной территории**

191. При оказании неотложной помощи пациенту с открытым пневмотораксом необходимо

- **наложить окклюзионную повязку**

192. При опиатной коме ведущим патогенетическим фактором в нарушении дыхания является:

- **угнетение дыхательного центра**

193. При осмотре пациента с отравлением обращают внимание на:

- **сознание, кожные покровы и слизистые оболочки, размер зрачков**

194. При острой дыхательной недостаточности противопоказаны

- **наркотические анальгетики**

195. При остром аппендиците на догоспитальном этапе необходимо

- **лечение не требуется**

196. При отёке лёгких применяется группа лекарственных средств

- **нитраты**

197. При отказе от госпитализации больного с подозрением на прободную язву желудка и двенадцатиперстной кишки фельдшеру скорой помощи следует:

- **объяснить ситуацию и настоять на госпитализации**

198. При отравлении антихолинергическими препаратами наблюдается:

- **брадикардия**

199. При отравлении ядовитыми грибами неотложная помощь направлена:

- **на ликвидацию обезвоживания и коллапса**

200. При передозировке героина, специфическая антидотная терапия заключается в введении:

- **налоксона**

201. При переломах ребер без повреждения органов грудной клетки необходимо обеспечить:

- **обезболивание, транспортировку в полусидячем положении**

202. При переломе бедра на догоспитальном этапе необходимо фиксировать:

- **тазобедренный, голеностопный и коленный суставы**

203. При переломе диафиза плечевой кости лестничная шина для транспортной иммобилизации должна фиксировать:

- **плечевой, локтевой и лучезапястный суставы**

204. При переломе костей предплечья, иммобилизирующая шина накладывается:

- **от кончиков пальцев до средней трети плеча**

205. При повреждении костей предплечья транспортная иммобилизация должна исключить движения

- **в лучезапястном и локтевом суставах**



206. При повреждении лучезапястного сустава и пальцев кисти

- **шина располагается от концов пальцев до локтя**

207. При повреждении шейного отдела позвоночника с целью транспортной иммобилизации используют:

- **воротник Шанца**
- **шейный корсет**

208. При полной атриовентрикулярной блокаде на ЭКГ отмечается:

- **отсутствие связи между зубцом Р и комплексом QRS**

209. При появлении потуг во время транспортировки роженицы фельдшер скорой помощи должен:

- **остановить машину и принять роды**

210. При приступе бронхиальной астмы противопоказан

- **Морфин**

211. При проведении медико-социальной экспертизы граждан

- **имеет право на приглашении по своему заявлению любого специалиста**

212. При синдроме «острого живота» необходимо

- **применить холод, срочно госпитализировать больного**

213. При сосудистом (перераспределительном) шоке происходит:

- **уход крови в депо – органы брюшной полости**

214. При травматическом шоке средней степени тяжести показано введение

- **коллоидных и кристаллоидных растворов**

215. При транспортировке больного с инсультом необходимо:

- **убрать из-под головы подушку, избегать изменения положения головы**

216. При транспортировке больного фельдшер должен:

- **находиться рядом с пациентом, осуществляя необходимую медицинскую помощь**

217. При тяжелых острых аллергических состояниях применяют:

- **преднизолон**

218. При цереброваскулярной коме на фоне артериальной гипертензии применяют:

- **болюсное введение гипотензивных препаратов**

219. При эксикозе второй степени парентеральную регидратацию начинают:

- **5%-10% раствором глюкозы**

220. При эксикозе второй степени потеря массы тела составляет:

- **5%-10%**

221. Прием вызовов и передача их выездным бригадам осуществляется:

- **фельдшером по приему и передачи вызова**

222. Прием вызовов от населения осуществляется:

- **централизованно по единому телефону «03» круглосуточно**

223. Признаками клинической смерти являются:

- **потеря сознания и отсутствие пульса на сонной артерии**



224. Признаками отравления метиловым спиртом является:

- **состояние, сходное с алкогольным опьянением, нарушение зрения, вплоть до слепоты, нитевидный пульс, одышка, головная боль, снижение артериального давления**

225. Признаками эклампсии являются:

- **судороги и кома**

226. Признаком геморрагического шока является:

- **частый нитевидный пульс**

227. Применение венозных жгутов снижает:

- **преднагрузку**

228. Причина механической желтухи при холецистите

- **закупорка камнем общего желчного протока**

229. Причиной геморрагического инсульта, чаще всего, является:

- **разрыв аневризмы сосуда мозга на фоне атеросклероза и артериальной гипертензии**

230. Причиной острой обтурационной кишечной непроходимости являются:

- **каловые камни**

231. Причиной развития ДВС-синдрома чаще является:

- **преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты**

232. Причиной эндогенных отравлений может быть:

- **синдром длительного сдавления**

233. Причины развития ДВС-синдрома

- **массивное кровотечение**

234. Проведение сеансов массового целительства

- **запрещается в любом случае, в том числе использование средств массовой информации**

235. Продолжительность сердечно-легочной реанимации при ее неэффективности

- **30 минут**

236. Противопоказанием для применения β -адреноблокаторов является:

- **bronхообструктивный синдром**

237. Противопоказанием для проведения сердечно-легочной реанимации является:

- **травма не совместимая с жизнью**

238. Противопоказанием для транспортировки является:

- **клиническая смерть**

239. Профилактикой кровотечения в родах является:

- **внутривенное введение метилэргометрина или окситоцина**

240. Проявления острого нарушения мозгового кровообращения при гипертоническом кризе

- **очаговая неврологическая симптоматика**

241. Психоз, независимо от вида отравления, купируют:

- **введением нейролептиков**

242. Рвота при остром панкреатите

- **многократная, не приносящая облегчения**



243. Реанимационные мероприятия после освобождения из петли включают:

- туалет полости рта и носоглотки, устранение судорог, сердечно-легочную реанимацию, интубацию трахеи

244. Ритм галопа отражает:

- снижение сократительной способности миокарда

245. С какой целью применяются нейропротекторы (глицин, семакс) при оказании неотложной помощи больному с инсультом:

- для защиты нервных клеток от гипоксии

246. Сведения о диагнозе при оформлении листа нетрудоспособности

- вносятся с согласия пациента, а в случае его не согласия указывается только причина нетрудоспособности

247. Свободный газ в брюшной полости определяется при:

- перфоративной язве желудка

248. Симптом Кернига выявляется у больных

- менингитом

249. Симптом напряженного пневмоторакса

- подкожная эмфизема тканей на стороне поражения

250. Симптом острой правожелудочковой недостаточности

- периферические отёки

251. Симптом раздражения мозговых оболочек (менингеальный симптом):

- напряжение (ригидность) заднешейных мышц

252. Симптомы повреждения спинного мозга при травмах позвоночника

- паралич конечностей, расстройство чувствительности, нарушение функции тазовых органов

253. Симптомы прохождения тока через мозг и сердце

- потеря сознания, остановка дыхания, фибрилляция желудочков сердца

254. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания это:

- осложнение при массивных кровопотерях

255. Скорая медицинская помощь гражданам Российской Федерации и иным лицам, находящимся на ее территории оказывается:

- бесплатно

256. Скорая медицинская помощь означает:

- экстренную медицинскую помощь, направленную на устранение угрожающих жизни патологических состояний

257. Скорая неотложная медицинская помощь иностранным гражданам в РФ оказывается:

- бесплатно

258. Согласие взрослого пациента на госпитализацию

- не обязательно, если имеется угроза его жизни



259. Согласно Приказа №41 ДЗ Москвы от 25 января 2008 года, экстренную госпитализацию беременных и рожениц, не обследованных в амбулаторно-поликлинических условиях и при тяжелом состоянии пациентки следует осуществлять:

- **в обсервационные отделения акушерских стационаров, ближайших к месту вызова**

260. Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении реанимации взрослому человеку одним реаниматором

- **на 2 вдоха – 30 компрессий**

261. Средство купирования пеногашения при кардиогенном отёке лёгких

- **ингаляция паров спирта**

262. Станция скорой медицинской помощи при необходимости выдает:

- **справки произвольной формы с указанием даты, времени обращения, диагноза, оказанной помощи**

263. Стенотическое дыхание, изменение голоса, грубый кашель, наблюдаются у детей при:

- **ларингостенозе**

264. Строгий учет и контроль наркотических и сильнодействующих средств фиксируется:

- **в журнале приема и сдачи наркотических анальгетиков**

265. Судороги при синдроме Морганьи-Адамса-Стокса сочетаются с:

- **периодическим отсутствием пульса**

266. Судороги при столбняке начинаются с:

- **тонических судорог жевательных мышц (тризм)**

267. Тактика фельдшера выездной линейной бригады в случае выезда на квартиру к больному с острым психическим расстройством с агрессивными тенденциями:

- **организовать активное наблюдение за больным силами бригады, с привлечением работников полиции и вызвать выездную психиатрическую бригаду**

268. Тактика фельдшера выездной линейной бригады, в случае выезда на квартиру к больному с острым психическим расстройством без агрессивных тенденций:

- **организовать активное наблюдение за больным силами бригады, родных и вызвать выездную психиатрическую бригаду**

269. Тактика фельдшера выездной линейной бригады, в случае выявления симптомов острых психических расстройств:

- **проконсультироваться со старшим врачом-психиатром диспетчерского отдела психиатрической помощи**

270. Тактика фельдшера при дисфункциональном маточном кровотечении

- **введение лекарственных средств сокращающих матку, кровоостанавливающих лекарственных средств, холод на низ живота и госпитализация в гинекологическое отделение на фоне поддерживающей инфузионной терапии**

271. Тактика фельдшера при кровотечении у роженицы в 1 и 2 периодах родов

- **инфузионная кровозамещающая терапия, ингаляция кислорода, дача закисно-кислородного наркоза при угрозе разрыва матки, срочная транспортировка в ближайший акушерский стационар на носилках в горизонтальном положении**

272. Тактика фельдшера при нарушенной внематочной беременности

- **экстренная госпитализация в гинекологическое отделение на фоне поддерживающей инфузионной терапии**



273. Тактика фельдшера при подозрении на преждевременную отслойку нормально расположенной плаценты

- **экстренно транспортировать роженицу в ближайший акушерский стационар**

274. Тактика фельдшера при появлении у роженицы потуг во время транспортировки в акушерский стационар

- **проводить акушерское пособие в салоне скорой медицинской помощи**

275. Тактика фельдшера скорой помощи в случае, когда грыжа была вправлена самостоятельно больным до приезда фельдшера

- **обязательная госпитализация**

276. Типичное проявление перелома основания черепа

- **кровотечение, ликворрея из носа и ушей**

277. Типичное расположение аппендикса

- **правая подвздошная область**

278. Типичные фебрильные судороги у детей характеризуются:

- **дебютом в 1-3 года, продолжительностью от 1 до 10 мин**

279. Транспортировка больного с легочным кровотечением осуществляется в положении

- **сидя**

280. Транспортировка больного с менингококковой инфекцией проводится:

- **на носилках, не изменяя положения больного**

281. Транспортировка больного с продолжающимся наружным кровотечением осуществляется:

- **лёжа с приподнятым ножным концом**

282. Транспортировка пострадавшего с переломом костей таза должна осуществляться:

- **на щите в позе "лягушки"**

283. Транспортировка пострадавших с подозрением на перелом поясничного отдела позвоночника должна осуществляться:

- **на жестких носилках или щите**

284. Ухудшение бронхиальной проходимости при астматическом статусе возможно

- **при применении симпатомиметиков**

285. Фебрильные судороги у детей возникают:

- **на фоне подъема температуры тела без признаков поражения мозга**

286. Фельдшер выездной бригады должен уметь

- **пользоваться имеющейся медицинской аппаратурой**

287. Фельдшер выездной бригады при оказании помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения

- **оказывает медицинскую помощь**

288. Фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи имеет право повышать свою квалификацию

- **не реже одного раза в пять лет**

289. Фельдшер выездной бригады скорой помощи заполняет:

- **сопроводительный лист на госпитализацию**



290. Фельдшер по приему и передачи вызова обязан

- **принимать и своевременно передавать вызовы персоналу свободных выездных бригад**

291. Фельдшер скорой помощи прибыл на вызов к больному, которому родственники до прибытия врача начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Фельдшер свои действия начинает:

- **с оценки эффективности реанимации и ее продолжения**

292. Характерным для клинической картины начавшегося разрыва тела матки является:

- **схватки судорожного характера, матка между схватками не расслабляется, из половых путей появляются сукровичные выделения**

293. Характерным признаком преэклампсии у беременной с гестозом тяжелой степени является:

- **появление головной боли и нарушений зрения**

294. Характерными объективными признаками экссудативного плеврита являются:

- **притупление перкуторного звука, ослабление дыхания, смещение органов средостения в противоположную сторону**

295. Характерными симптомами для внематочной беременности являются:

- **острая внезапная боль внизу живота, бледные кожные покровы, скудные кровянистые выделения из влагалища, положительный симптом Щёткина-Блюмберга**

296. Цереброваскулярные обмороки развиваются при поражении артерий

- **мозговых**

297. Эпилептический статус – это:

- **повторные приступы генерализованных судорог без восстановления сознания**

298. Эффективная сердечно-легочная реанимация проводится:

- **До восстановления самостоятельной сердечной деятельности**

299. Эффективная транспортная иммобилизация при переломах костей голени требует фиксации

- **конечности от пальцев стопы до средней трети бедра**

Файл скачан с сайта oltest.ru

